

IMPFKALENDER

Impfungen und
passive Immunisierungen

Sprache: Deutsch

IMPfung

ALTER

Impfungen und passive Immunisierungen sollten zum frühestmöglichen Zeitpunkt erfolgen.

Die Überprüfung des Impfstatus ist in jedem Lebensalter sinnvoll. Fehlende Impfungen sollten sofort,
entsprechend den Empfehlungen für das jeweilige Lebensalter, nachgeholt werden.

Empfehlungen der Ständigen Impfkommission
(STIKO), 2026. www.stiko.de

ROBERT KOCH INSTITUT



in Wochen				in Monaten								in Jahren										
00	06	2	3	4	5-7	8-10	11*	12	13-14	15	16-23	2-4	5-6	7-8	9-11	12-14	15-16	17	18-24	25-59	60-74	ab 75
U2/U3		U4			U5		U6				U7	U7a/U8	U9	U10	U11/J1	J1		J2				

RSV	Monoklonale Antikörper (Einmaldosis) ^a				N											
Rotaviren	G1 ^b		G2	(G3)												
Tetanus ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N		A1	N	A2	N	A ^g				
Diphtherie ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N		A1	N	A2	N	A ^g				
Pertussis ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N		A1	N	A2	N	A3 ^g	N			
Haemophilus influenzae Typ b ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N										
Poliomyelitis ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N				A1	N					
Hepatitis B ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N										
Pneumokokken ^c	G1	N	G2	N	G3 ^d	N							S ⁱ			
Meningokokken B ^e	G1	N	G2	N	G3 ^e		N									
Masern					G1	N	G2	N				S ^h				
Mumps, Röteln					G1	N	G2	N								
Varizellen					G1	N	G2	N								
Humane Papillomviren									G1 G2 ^f		N					
Meningokokken ACWY									G1	N						
Herpes zoster											G1 G2 ^j	N				
Influenza											S (jährlich)					
COVID 19											S (jährlich)					
RSV (Impfung)											S ^k					

ERLÄUTERUNGEN

G GRUNDIMMUNISIERUNG

(in bis zu 3 Teilimpfungen G1 – G3)

S STANDARDIMPFUNG

A AUFFRISCHIMPFUNG

N NACHHOLIMPFUNG

(Grundimmunisierung aller noch nicht Geimpften
bzw. Komplettierung einer unvollständigen Impfserie)

U Früherkennungsuntersuchung

J Jugenduntersuchung

(J1 im Alter von 12–14 Jahren)

- a RSV (monoklonale Antikörper):** Zwischen April und September Geborene sollen Nirsevimab oder Clesrovimab im Herbst vor Beginn ihrer 1. RSV-Saison erhalten; Neugeborene jeglichen Gestationsalters, die während der RSV-Saison (meist zwischen Oktober und März) geboren werden, sollen Nirsevimab oder Clesrovimab möglichst rasch nach der Geburt erhalten, idealerweise bei Entlassung aus der Geburtseinrichtung bzw. bei der U2 (3.-10. Lebenstag).
- b Rota:** Erste Impfstoffdosis bereits ab dem Alter von 6 Wochen, je nach verwendetem Impfstoff 2 bzw. 3 Impfstoffdosen im Abstand von mind. 4 Wochen.
- c TdapHibIPV/HepB/Pnc:** Frühgeborene: zusätzliche Impfstoffdosis im Alter von 3 Monaten, d. h. insgesamt 4 Impfstoffdosen.
- d TdapHibIPV/HepB/Pnc:** Mindestabstand zur vorangegangenen Dosis: 6 Monate.
- e MenB:** 3 Dosen im Alter von 2 bis 23 Monaten, ab 24 Monaten besteht die Impfserie aus 2 Dosen
- f HPV:** Zwei Impfstoffdosen im Abstand von mind. 5 Monaten, bei Nachholimpfung beginnend im Alter ≥ 15 Jahren oder bei Impfabstand von < 5 Monaten zwischen 1. und 2. Dosis ist eine 3. Dosis erforderlich.
- g Td(ap):** Td-Auffrischimpfung alle 10 Jahre. Nächste fällige Td-Impfung 1-malig als Tdap- bzw. bei entsprechender Indikation als Tdap-IPV-Kombinationsimpfung.
- h MMR:** Eine Impfstoffdosis eines MMR-Impfstoffs für alle nach 1970 geborenen Personen ≥ 18 Jahre mit unklarem Impfstatus, ohne Impfung oder mit nur einer Impfung in der Kindheit
- i Pnc:** Impfung mit PCV20.
- j H. zoster:** Zwei Impfstoffdosen des adjuvantierten Herpes-zoster-Totimpfstoff im Abstand von mindestens 2 bis maximal 6 Monaten.
- k RSV (Impfung):** 1-malige Impfung im Spätsommer/Herbst vor Beginn der RSV-Saison

* Impfungen können auf mehrere Impftermine verteilt werden. MMR und V können am selben Termin oder in 4-wöchigem Abstand gegeben werden.

Nächste Impftermine

